

ACTIMOZ®

A graphic element consisting of a green circle and a red crosshair, which is part of the ACTIMOZ branding.

PRINCIPIO ACTIVO: Azitromicina 500 mg.

ACCIÓN: Antibiótico del **grupo de los macrólidos**. Actúa **inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas**, sin afectar los ácidos nucleicos. Posee **amplio espectro** frente a bacterias **grampositivas, gramnegativas, anaerobias** y **microorganismos de transmisión sexual** como *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*.

VENTAJAS:

- **Alta eficacia** con una sola dosis diaria durante 3 a 5 días.
- **Buena tolerancia** y rápida absorción oral.
- **Amplia distribución tisular** (pulmones, amígdalas, próstata).
- **Vida media larga (68 horas)** que permite esquemas cortos.
- **Eliminación principalmente biliar**, reduciendo carga renal.



INDICACIONES: Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles:

- **Tracto respiratorio alto y bajo:** faringitis, sinusitis, bronquitis, otitis media, neumonía.
- **Piel y tejidos blandos:** infecciones por *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes*.
- **Enfermedades de transmisión sexual:** infecciones genitales no complicadas por *Chlamydia trachomatis* o *Neisseria gonorrhoeae*.

PRESENTACIÓN:

Caja con 3 cápsulas de 500 mg.

* La información contenida en esta ficha técnica es de carácter informativo y no sustituye la evaluación, diagnóstico ni el criterio profesional de un médico.

DOSIS:

- **Adultos:** 500 mg (1 cápsula) una vez al día durante 3 a 5 días, según el tipo y severidad de la infección.
- **En ETS por *Chlamydia trachomatis*:** 1 g (2 cápsulas) como dosis única.
- Tomar 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.

